


ยุ่งลาย กับ โรคไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะของโรค เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 5-14 ปี

1 ไข้มุงลาย

- มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ระยะ 2-5 วัน
- หน้าแดง • มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ

2 อาการเลือดออก

- เลือดกำเดาไหล • มีจุดเลือดออกตามตัว
- ถ่ายดำ • เลือดออกตามไรฟัน
- อาเจียนเป็นเลือด

3 ตับโต

- กดเจ็บใต้ชายโครงด้านขวา

4 ภาวะช็อค

- มักจะเกิดช่วงไข้จะลด • มีอาการปวดท้องมาก
- ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย
- อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
- มือ-เท้า เย็น ชีพจรเบา เร็ว • ความดันต่ำ

รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ
2. ให้อาหารอ่อนหรือพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เนื่องจากจะทำให้เกิดเลือดผิดปกติ และระคายเคืองเพาะอาหาร
3. ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำ
4. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า 2 วัน หรือมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง, ปัสสาวะน้อยลง, กระสับกระส่าย, มือเท้าเย็น, ชีพจรเบา-เร็ว, ความดันต่ำ

****ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที****

5. ภายใน 24-48 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีอาการไข้ลดลงแล้ว เริ่มกินอาหารได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตราย

ป่วยไข้เลือดออกเมื่อไร

รีบไปพบแพทย์

ด้วยความปรารถนาดีจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

“รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และกำจัดยุ่งลายพาหะของโรค”

